GRUPO DE INVESTIGACIÓN PACHIRA PULCHRA

BOMBACACEAE NEOTROPICAE NOVAE VEL MINUS COGNITAE VII. REDESCUBRIMIENTO DE PACHIRA PULCHRA PLANCH. & LIND. EX TRIANA & PLANCH

El género *Pachira* Aubl., en su actual circunscripción, es el más extenso de la tribu *Adansonieae* y cuenta en la actualidad con 45-50 especies neotropicales (Alverson 1994, Fernández-Alonso 1998a). Colombia cuenta con el mayor número de especies en su territorio (unas 30 según los últimos datos), de las cuales al menos seis han sido recientemente descritas o se encuentran en proceso de descripción (Fernández-Alonso 1998b, 2002, 2003a, 2003b). De las especies colombianas, *Pachira pulchra* Planch. & Lind. ex Triana & Planch. era una de las menos conocidas, al no contarse con información posterior a la colección efectuada por José J. Triana en la década de 1860, en la localidad típica, en cercanías de la ciudad de Ocaña (Norte de Santander). Al contarse con información reciente sobre esta especie, proveniente de dos localidades Caldasia 25(1) 2003: 65-71 66 *Pachira pulchra* (Bombacaceae) nuevas del departamento de Norte de Santander, se documenta en esta contribución la presencia y la distribución conocida de *Pachira pulchra* en Colombia. Por otra parte, dado que hasta la fecha sólo se habían descrito las flores de esta especie, se complementa la descripción de los frutos y las semillas con base en las recientes colecciones efectuadas en zonas cercanas a la localidad típica. Se comentan también las afinidades de *P. pulchra* con *P. dugandeanae* (Robyns) Fern. Alonso y se presenta una clave para las cinco especies andinas del género *Pachira*, ubicadas por A. Robyns en la Secc. *Bombacopsis* del género *Bombacopsis*, todas ellas provistas de flores anchas y cortas, con cálices tomentosoaterciopelados (*P. dugandeanae*, *P. patinoi* (Dugand & Robyns) Fern. Alonso, *P. pulchra*, *P. subandina* (Dug

Observaciones taxonómicas. Las plantas ahora estudiadas presentan tubo estaminal con bandas finamente pilosas en su cara externa, carácter que las separaría de las colecciones típicas conocidas, cuyo tubo estaminal es glabro o glabrescente (Robyns 1963). *P. pulchra* se caracteriza por tener hojas subcoriáceas, pequeñas, obtusas y glabras, cáliz de mediano tamaño, pubescente tomentoso, y tubo estaminal corto, de ca. 2 cm, glabro o piloso, combinación de caracteres que permite separarla de especies cercanas como *P. trinitensis*, *P. dugandeanae* y *P. subandina*. Estas cuatro especies, que fueron ubicadas por Robyns (1963) en la Secc. *Bombacopsis* del género *Bombacopsis*, conforman junto con *P. patinoi*, un grupo típicamente andino con distribución centrada en Colombia. De todo el grupo, *P. pulchra* se acerca más a *P. dugandeanae* por sus botones florales gruesos, flores de tamaño mediano y por su tubo estaminal provisto de indumento en la cara externa. Por el contrario presentan hojas muy diferentes, siendo papiráceas

y caudado-acuminadas en el ápice en *P. dugandean*, mientras que *P. pulchra* las presenta subcoriáceas y obtusas o emarginadas en el ápice.

Bibliografía: BOMBACACEAE NEOTROPICAE NOVAE VEL MINUS COGNITAE VII. REDESCUBRIMIENTO DE *PACHIRA PULCHRA* PLANCH. & LIND. EX *TRIANA* & PLANCH./JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-ALONSO, LUIS ROBERTO SÁNCHEZ MONTAÑO, ROBINSON GALINDO-T / universidad de pamplona, /2003